

INCIDENȚA HIPERTENSIUNII ARTERIALE ÎN UNELE BOLI ALE ȚESUTULUI CONJUNCTIV

C. I. Taisescu¹, Amelia Maria Găman²

Rezumat. Bolile țesutului conjunctiv se asociază deseori cu manifestări cardiovasculare, cele mai frecvent întâlnite fiind miocardita, pericardita, tulburările de ritm și de conducere, hipertensiunea arterială (HTA), insuficiența cardiacă. Studiul nostru a urmărit incidența HTA la un lot de 103 pacienți cu boli de colagen și manifestări cardiovasculare, stabilirea unor corelații între tipul manifestării cardiovasculare și tipul colagenozei, prezența hipertensiunii arteriale ca unică manifestare cardiovasculară sau în asociere cu alte complicații, în funcție de tipul bolii de colagen.

Cuvinte-cheie: colagenoze, hipertensiune arterială, incidență.

Abstract. Connective tissue disease is often associated with cardiovascular manifestations, the more frequent of them being: myocarditis, pericarditis, cardiac arrhythmias, arterial hypertension, heart failure. In our study on 103 patients with connective tissue diseases and cardiovascular complications we tried to establish the incidence of arterial hypertension, some correlations between type of connective tissue disease and cardiovascular manifestations, the presence of arterial hypertension such as a single cardiovascular manifestation or in association with another complications in according to the type of connective, tissue disease.

Keywords: connective tissue diseases, arterial hypertension, incidence.

INTRODUCERE

Bolile țesutului conjunctiv se asociază deseori cu manifestări cardiovasculare, cele mai frecvent întâlnite fiind: miocardita, pericardita, endocardita, vasculita arterelor coronare, în poliartrita reumatoidă (3,6,8,10); pericardita, miocardita, tulburările de ritm, hipertensiunea arterială, în lupusul eritematos sistemic (1,3,5,10); pericardita, insuficiența cardiacă congestivă, tulburările de ritm, miocardita, în sclerodermie (4, 10); modificări de repolarizare evidențiate electrocardiografic,

cardiomiopatie dilatativă, în poli-/dermatomiozită (3); pericardita, miocardita (inducând tulburări de ritm și conducere, insuficiență cardiacă), prolapsul de valvă mitrală, în boala mixtă de țesut conjunctiv (2,3,7).

Studiul nostru a urmărit incidența hipertensiunii arteriale (HTA) la un lot de 103 pacienți cu boli de colagen și manifestări cardiovasculare, corelația între tipul manifestării cardiovasculare și tipul colagenozei, prezența hipertensiunii arteriale ca unică manifestare cardiovasculară sau în asociere cu alte complicații, în funcție de tipul bolii de colagen.

¹Dr. Cîțo Iulian Taisescu, Doctor în Medicină, medic rezident medicină internă, asistent univ., Disciplina Fiziopatologie, U.M.F.-Craiova.

²Conf. univ. dr. Amelia Maria Găman, Doctor în Medicină, medic primar medicină internă și hematologie, Disciplina Fiziopatologie, U.M.F. - Craiova.