

# MORTALITATEA ÎN RÂNDUL CONSUMATORILOR DE DROGURI O PROBLEMĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Madi Surugiu<sup>1</sup>, Dana Galieta Mincă<sup>2</sup>

**Rezumat.** După datele furnizate de Centrul European de Monitorizare a Drogurilor și Dependenței de Droguri, consumul de droguri a devenit un fenomen răspândit, o serioasă problemă de sănătate publică în Europa de Vest și un fenomen în creștere în Europa de Est (1). Există dificultăți metodologice în evaluarea dimensiunii și consecințelor consumului de droguri, populația consumatorilor fiind o populație ascunsă; abuzul de droguri poate avea implicații serioase în planul sănătății individuale și publice. Consumul de droguri este responsabil de tulburări fizice și psihice, care conduc la un procent crescut de decese, în mod particular în rândul populației tinere. Mortalitatea poate fi considerată un indicator, cu un înalt nivel de încredere și validitate, al efectelor în planul sănătății generate de expunerea activă - comportamentală la consumul de droguri, afirmație adevărată pentru mortalitatea generală asociată consumului de droguri; mortalitatea pe cauze specifice de deces (intoxicație acută/supradoză, accident etc.) la nivelul statelor membre are o largă heterogenitate, din cauza clasificării diferite a cauzei deceselor produse, ca urmare a consumului de droguri, indiferent de standardul internațional utilizat - Clasificarea Internațională a Maladiilor și cauzelor de deces versiunile 9 sau 10.

**Cuvinte-cheie:** drog, mortalitate, supradoză, deces.

*Decesele, ca urmare a consumului de droguri, și mortalitatea asociată consumului de droguri reprezintă unul dintre cei 5 indicatori epidemiologici-cheie, utilizați de Centrul European de Monitorizare a Drogurilor și Dependenței de Droguri (CEMDDD) pentru estimarea consecințelor medicale generate de consumul de droguri și a dimensiunii consumului.*

**Abstract.** According to the data published in the last decade by the European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), drug use became a mass phenomenon and a serious public health problem in Western Europe and a rising problem in Eastern Europe (1). It is widely accepted that there are methodological difficulties in assessing the dimension and the consequences of drug use, since the population is a hidden one and also that drug use can have important side effects for both personal and public health. Drug use accounts for physical and psychological disorders, leading to disabilities and an increase number of death, especially among youth. Thus, mortality can be considered as a reliable and valid indicator for evaluating health effects caused by drugs. This is particularly true for general drug related mortality while mortality by specific causes of death (acute intoxication, overdose, accident etc.) is regarded as more temporarily and geographically heterogenic at Member States level, due to the different recording systems for drug related deaths, no matter of the international standard used - International Classification of Diseases versions 9 or 10.

**Keywords:** drug, mortality, drug overdose, death.

Estimarea dimensiunii consumului se referă în general la obținerea unui răspuns la întrebarea *Câți consumatori de droguri avem?*. Deși o întrebare simplă în aparență, experții în domeniu consideră dificilă aprecierea dimensiunii, la un moment dat, a populației de consumatori de droguri din totalul populației generale (2). Explicația este strâns legată de ilegalitatea fenomenului -

<sup>1</sup>Dr. Madi Surugiu (Ministerul Administrației și Internelor), Direcția Medicală, medic medicină generală, doctorand anul II, Catedra de Sănătate Publică și Management, specializarea Medicină Socială.

<sup>2</sup>Prof. dr. Dana Galieta Mincă, medic primar sănătate publică, Disciplina de Sănătate Publică și Management, U.M.F. „Carol Davila”, București.